

Lézeres körömgomba-kezelés, az új terápiás lehetőség!

A körömgombától szerte a világon sok millió ember szenved. Ecsetelőkkel, krémekkel, szájon át szedhető gyógyszerekkel próbálják hosszú hónapokon át megszüntetni, eltüntetni ezt a mikroszkopikus méretű organizmust. A külsőleges készítmények korlátozott hatékonysága, továbbá a belsőleges készítmények gyakori mellékhatásainak (pl. májkárosodás) előfordulása és más gyógyszerekkel való káros kölcsönhatása egy új terápiás lehetőség felé irányította a figyelmet.

Hogyan működik?

A lézeres körömgomba-kezelés a szelektív fototermolízis elvén alapul. A speciális, nagy teljesítményű (Nd-YAG) lézerfény egyrészt a körömlemezen keresztül hatolva kizárólag a gombasejtekben és fonalakban nyelődik el, ezáltal a környezetet megkímélve direkt elpusztítja azokat. Másrészt a körömágyban, körömlemezben megemelkedő hőmérséklet által indirekt módon öli meg a hőérzékeny kifejlett gombákat és annak spóráit.

Melyek a lézeres körömgomba-kezelés előnyei?

- Legmagasabb klinikai hatékonyság (80-90%-os gyógyulási esély),
- gyors és kényelmes kezelés,
- kíméletes eljárás - enyhe melegségérzettel jár csupán,
- biztonságos terápia, nincs mellékhatás,
- a páciensek a kezelést követően azonnal visszatérhetnek a napi tevékenységükhöz.

A kezelés menete:

1. A fertőzött köröm vizsgálata, dokumentáció kitöltése,
2. a köröm fertőtlenítése,
3. fotódokumentáció a terápia nyomon követése céljából,
4. a körmök lézeres kezelése,
5. a cipők fertőtlenítése,
6. „Körömgomba utókezelési útmutató” átadása a beteg részére.

Gyakorlati tudnivalók:

- A kezelést megelőzően **fontos**, hogy eltávolítsa a körömlakkot, de azt követően 24 órával már újra lakkozhatja körmeit.
- Új, még nem használt zoknit, harisnyát hozzon magával a kezelésre!

Az eljárás során végtagonként - az újrafertőzés veszélye miatt - minden körmet kezelni kell, hiszen ha szemmel nem is láthatóan, de mikroszkóposan valamennyi köröm fertőzött. A művelet összesen 25-30 percet vesz igénybe.

A kezeléseket alatt semmilyen kellemetlenség nem tapasztalható, csupán enyhe melegséget lehet érezni a beavatkozás helyén. Ritkán - az elváltozás jellegétől függően - a sérült, károsodott köröm leesésével kell számolni.

A páciensek a kezelést követően azonnal visszatérhetnek a napi tevékenységükhöz.

A beteg köröm fertőzésétől és helyétől függően a kezeléseket - FDA minősítéssel rendelkező **CUTERA Nd-YAG** lézerrel - **4 hetente, 4-6 alkalommal** végezzük,

Agyógyulás megjelenésének ideje változó, átlagosan kézen 2-3, míg lábon 3-6 hónapon belül látható az eredmény.

